

# নিডল্যাক্স

ইসবগুল ডুসি  
ফ্লোভারড পাউডার




চিনিমুক্ত

- ✓ আত্মিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে
- ✓ অস্ত্রের কার্যকারিতা নিয়মিত করে
- ✓ কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে
- ✓ কমলার স্বাদযুক্ত
- ✓ প্রাকৃতিক আর্শযুক্ত পানীয়
- ✓ আরামদায়ক ভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে

**বর্ণনা :** নিডল্যাক্স পাউডারে কার্যকরী উপাদান হিসাবে ইসবগুল ফ্লেভারড পাউডার (ডেসার্ট ইন্ডিয়ানহুইট) রয়েছে। নিডল্যাক্স পাউডার পানির সংমিশ্রণে কমলার স্বাদযুক্ত পানীয় তৈরি করে যা কোষ্ঠকাঠিন্য ও পেটের সমস্যা নিরাময়ে ব্যবহার্য।

**কেন নিডল্যাক্স গ্রহণ করা উচিত :** নিডল্যাক্স পাউডার, ইসবগুল ফ্লেভারড পাউডার (ডেসার্ট ইন্ডিয়ানহুইট) পানির সংস্পর্শে আসলে ফুলে ওঠে এবং বিরেচক হিসাবে কাজ করে। নিডল্যাক্স পাউডার এর উপাদান পলিস্যাকারাইড ইস্টেসটাইনের ভিতরে জেল তৈরি করে যা মলকে পিচ্ছিল করে এবং মলত্যাগ আরামদায়ক করে। জোড়াল উদ্দিপনা অস্ত্রের দেওয়ালে একটি প্রতিবিম্ব সংকোচন সৃষ্টি করে অস্ত্রকে খালি করে। এটি অস্ত্রের দৈনিক গতিবিধি বৃদ্ধি করে, শুষ্ক ও পানিযুক্ত মলের ওজন বাড়ায় এবং গাট্টাঙ্জিট এর সময় কমিয়ে দেয়। ডায়রিয়া রোগীর ক্ষেত্রে ইহা মলের পানি ধারণ ক্ষমতা এবং সাদৃশ্যতা বৃদ্ধি করে, যার মাধ্যমে পাকাশয় খালি হতে দেরি হয় এবং মলের স্থায়িত্ব কাল বাড়ে। এটি আলসারেটিভ কোলাইটিস নিরাময়ে ভূমিকা রাখে।

## প্রস্তুত প্রণালী :



সরবরাহকৃত চামচের সাহায্যে সাধারণত এক চামচ পরিমাণ নিল।



খালি গ্লাসে সম্পূর্ণ পাউডার ঢালুন।



গ্লাসে পানি মিশিয়ে নাড়ুন এবং যত দ্রুত সম্ভব পান করুন।

**উপাদান :** প্রতি ৫ গ্রাম এ আছে ইসবগুল ফ্লেভারড পাউডার (ডেসার্ট ইন্ডিয়ানহুইট) ৩ গ্রাম এবং অন্যান্য উপাদান।

**কার্যকারিতা :** দীর্ঘস্থায়ী (পুরাতন) ও অস্থায়ী (নতুন) কোষ্ঠকাঠিন্য, আইবিএস (ইরিটেবল বাউয়েল সিনড্রোম বা অস্ত্রের বিবর্তকর গতিবিধি উপসর্গ), অর্শরোগ বা পাইলস, হৃদরোগ, অতিরিক্ত কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, স্থূলতা, মলাশয় প্রদাহ ও কোলন ক্যান্সার এর চিকিৎসায় কার্যকর।

**সেবন মাত্রা :** কোষ্ঠকাঠিন্য : প্রাপ্তবয়স্ক অথবা অনূর্ধ্ব ১২ বছর বয়স পর্যন্ত : ১ চামচ নিডল্যাক্স পূর্ণ গ্লাস পানির সহিত মিশিয়ে দৈনিক ১-৩ বার অথবা রেজিঃ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**৬-১২ বছর বয়সের শিশু :** বয়স ও ওজন অনুযায়ী ½ - ১ চামচ নিডল্যাক্স পানির সহিত মিশিয়ে দিনে দুইবার অথবা রেজিঃ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**আইবিএস :** প্রত্যহ ৬.৪ গ্রাম থেকে ৩০ গ্রাম পর্যন্ত ২-৩ বার বিভক্ত ভাগে সেব্য।

**পাইলস :** প্রত্যহ ১০.৫ গ্রাম থেকে ২০ গ্রাম পর্যন্ত ২-৩ বার বিভক্ত ভাগে সেব্য।

**হৃদরোগ :** প্রত্যহ ৭ গ্রাম থেকে ১৮ গ্রাম পর্যন্ত ২-৩ বার বিভক্ত ভাগে সেব্য।

**হাইপারলিপিডেমিয়া :** ৩.৪ গ্রাম করে প্রত্যহ ৩ বার অথবা ৫.১ গ্রাম করে দিনে ২ বার সর্বোচ্চ ২০.৪ গ্রাম পর্যন্ত।

**আলসারেটিভ কোলাইটিস এবং কোলন ক্যান্সার :** প্রত্যহ ৩.৪ গ্রাম থেকে ১০ গ্রাম পর্যন্ত ২-৩ বার বিভক্ত ভাগে সেব্য।

**ডায়াবেটিস :** ৩.৪ গ্রাম থেকে ২২ গ্রাম পর্যন্ত ২-৩ বার বিভক্ত ভাগে সেব্য।

**স্থূলতা :** ১.৭ গ্রাম থেকে ৩৬ গ্রাম পর্যন্ত ২-৩ বার বিভক্ত ভাগে সেব্য।

অথবা রেজিঃ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

নিডল্যাক্স খাবারের পর সেবন করা ভালো এবং সেবনের পর অতিরিক্ত এক গ্লাস পানি পান করা উচিত। ঘুমোতে যাবার ঠিক আগেই এটি গ্রহণ করা উচিত নয়। বিরেচক হিসেবে এই ঔষধ ২৪ ঘন্টার মধ্যে মলের পরিমাণ বাড়তে সক্ষম, তবে পুরো কার্যকারিতার জন্য ২-৩ দিন লাগতে পারে।

**পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :** নির্দিষ্ট মাত্রায় সেবনে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নাই।

**অন্য ঔষধের সাথে ক্রিয়া :** ইসবগুল ফ্লেভারড পাউডার (ডেসার্ট ইন্ডিয়ানহুইট) কার্বামাজেপাইন এর সাথে মিথক্রিয়া করে।

**প্রতি নির্দেশনা :** যে সকল রোগীদের অস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা বা জটিলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

**গর্ভাবস্থায় :** শুধুমাত্র ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**প্রস্তুতকারক :**  
**BEXTER** বেস্টার ফার্মাসিউটিক্যালস্

(আয়ুর্বেদিক ডিভিশন)  
বগুড়া, বাংলাদেশ।

Mfg. Lic. No.: Ay -189  
D A R No.: Ay - 18 - A - 113  
web : www.bexterlab.com  
http://www.facebook.com/bexterlab  
Hotline : +88-01705-434040  
+88-01718-442897

120 gm

# Nidlax

ISABGUL HUSK  
FLAVORED POWDER




Sugar Free

- ✓ Maintains Bowel Regularity
- ✓ Regularizes Bowel
- ✓ Reduces Cholesterol
- ✓ Orange Flavour
- ✓ Natural Fiber Drink
- ✓ Gently Relieves Constipation

**Description :** Nidlax powder contains Isabgul Flavoured Powder (Desert Indianwheat) as an active ingredient. When the Nidlax powder is mixed with water, it forms an orange flavoured drink that helps to relieve constipation & regularize bowel.

**Why should we take Nidlax :** Nidlax powder, Isabgul Flavoured Powder (Desert Indianwheat) actually swells on contact with water and acts as a laxative. Polysaccharide, ingredient of Nidlax powder form a gel inside the intestine which lubricates the stool and makes defecation comfortable. Strong stimulation empties the intestine by causing a reflex contraction in the intestinal wall. It increases the daily movement of the bowel, increases the weight of dry and watery stools and reduces the time of gut transit. In case of diarrhea, it increases the water holding capacity and viscosity of the stool, which delays the emptying of the stomach and increases the stability of the stool. It helps in curing ulcerative colitis.

## Preparation Method :



Take one spoonful with the provided spoon



Put powder into an empty glass



Fill glass with water, stir & drink as quickly as possible.

**Composition :** Each 5 gm contains Isabgul Flavoured Powder (Desert Indianwheat) 3 gm and other ingredients.

**Indication :** Effective for the treatment of chronic and occasional constipation, IBS (Irritable Bowel Syndrome), Hemorrhoids or piles, Heart Disease, Hyperlipidemia, Diabetes, Obesity, Ulcerative Colitis & Colon Cancer.

**Dosage : Constipation : Adult or till 12 years :** 3.5 gm (1 table spoonful) 1-3 times daily mix with a full glass of water. (1 table spoonful 1-3 times daily or as directed by reg. physician.)

**Child : 6-12 years :** ½ to 1 level 5-ml spoonful bid to be dissolved in water for required age and weight.

**IBS :** 6.4 grams to 30 grams per day in two to three divided doses daily.

**Hemorrhoids :** 10.5 grams to 20 grams daily in divided doses.

**Heart Disease :** At least 7 grams to 18 grams per day in 2-3 divided doses.

**Hyperlipidemia :** 3.4 grams three times daily or 5.1 grams twice daily up to 20.4 grams per day.

**Ulcerative colitis & Colon Cancer :** 3.4 to 10 grams 2-3 times daily.

**Diabetes :** 3.4 grams to 22 grams daily in divided doses.

**Obesity :** 1.7 grams to 36 grams daily in divided doses.

Or as directed by the reg. physician.

It is better to take Nidlax after meal and drink an extra glass of water. It should not be taken just before going to sleep. As a laxative, it is capable of increasing stool volume within 24 hours, but may take 2-3 days for full functionality.

**Side effect :** Usually no side effects in recommended dosage.

**Drug Interactions :** Carbamazepine interacts with Isabgul Flavoured Powder (Desert Indianwheat).

**Contraindication :** Contraindicated in patients with gastrointestinal tract obstruction or obstruction of the bowel.

**Use in pregnancy and lactation :** Doctors recommendation needed.

Manufactured by :  
**BEXTER** BEXTER PHARMACEUTICALS  
(Ayurvedic Division)  
Bogura, Bangladesh.

Mfg. Lic. No.: Ay -189  
D A R No.: Ay - 18 - A - 113  
web : www.bexterlab.com  
http://www.facebook.com/bexterlab  
Hotline : +88-01705-434040  
+88-01718-442897

মিশ্রণ তৈরীর সাথে সাথে পান করুন।

Drink immediately after Preparing.